

	Comirnaty (Pfizer & BioNTech)	Vaccin ARN Moderna	Astrazeneca-ChAdOx1-S [recombinant]	Janssen Ad26.COVS
Description	ARNm codant pour la protéine S			Vecteur viral non répliquatif Adénovirus simien exprimant la Protéine S
Population concernée	> 18 ans	> 50 ans	≥ 60 ans	Plus de 55 ans
Indications	Professionnel de Santé Très haut risque de forme grave de COVID19	Risque de forme grave de COVID19	SANS COMORBIDITE À partir 16/04	Avec ou sans comorbidités et/ou pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-19
Schéma vaccinal	2 doses espacées de 42 jours (RV pris à partir du 14/04) 21 à 28 jours (délai maximal recommandé 42 jours)(RV pris avant 14/04) (3doses pour les immunodépressions graves)			2 doses espacées de 9 à 12 semaines
Conservation	Le flacon multidose doit être conservé congelé et être décongelé avant dilution. toutes les doses de vaccin doivent être utilisées dans les 6h suivant la dilution	Après décongélation, 30 jours au réfrigérateur et 12h conservé au frais jusqu'à une température comprise entre 8°C et 25°C, après ouverture à utiliser dans les 6h	après ouverture 6 heures à températures ambiantes ou 48h au réfrigérateur (entre 2 et 8°C)	Le flacon est conservé au congélateur. Une fois décongelé le flacon peut être conservé au réfrigérateur pendant 3 mois. Après ouverture 6 heures dans un réfrigérateur (entre 2 et 8°C)
Voie d'administration	Voie intramusculaire dans le muscle du deltoïde			
Efficacité	95% sur la réduction du nombre de cas de COVID 19 symptomatique	94% sur la réduction du nombre de cas de COVID 19 symptomatique	80% sur la réduction du nombre de cas de COVID 19 symptomatique	76% sur les formes sévères de la maladie
Effets indésirables				
Très fréquents (≥1/10)	Fatigue, céphalées, myalgies, frissons, arthralgies,			Douleur au site d'injection
		Lymphadénopathie, nausées vomissement	Nausées, malaise	Céphalées, fatigue, myalgies
Fréquents (≥1/100 à <1/10)				
Réaction locale	Rougeur	Erythème, urticaire, éruption cutanée*	Erythème, gonflement	
Réaction systémique	Nausées		Vomissement, diarrhées, fièvre	
Peu fréquents (≥ 1/1000 à <1/100)	Douleurs aux extrémités Lymphadénopathie Insomnies Malaise Prurit au site d'injection	Prurit au site d'injection	Lymphadénopathie Diminution de l'appétit Étourdissements Somnolence Hyperhidrose Prurit Éruption cutanée	
Réactions rares (≥1/10 000 à <1/1000)	Paralysie faciale périphérique. La relation causale avec le vaccin n'est pas établie. Dans la majorité des cas, la paralysie a disparu au bout d'une semaine			
Réactions très rares (<1/10 000)	Des troubles du rythme ont été identifiés chez certains patients et font l'objet de surveillance par le CRPV		Une combinaison de thrombose et de thrombocytopenie, accompagnés dans certains cas de saignements a été observée très rarement après la vaccination**	Une combinaison de thrombose et de thrombocytopenie, accompagnés dans certains cas de saignements a été observée très rarement après la vaccination**
Autres effets indésirables rapportés	Des réactions d'hypersensibilité et des réactions anaphylactiques ont été rapportées avec une fréquence indéterminée. Ces réactions allergiques sévères sont attendues selon une fréquence rare			Très rares cas d'urticaire, acouphènes, infarctus, convulsions et paralysie faciale ont été rapportés.

Les données de la pharmacovigilance post AMM sont disponibles sur le lien suivant :

<https://www.ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins>

Pour une meilleure détection des effets indésirables non connus liés aux vaccins contre la COVID-19 et afin d'alerter les autorités de santé, privilégiez la déclaration:

- Des effets indésirables graves (notamment entraînant une hospitalisation, une mise en jeu du pronostic vital ou décès)
- et/ou inattendus (non mentionnés dans l'information du produit ou intenses en sévérité pour un effet indésirable connu).

<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

* Vaccin ARN MODERNA : des réactions locales retardées non graves peuvent survenir plus de 7 jours après la vaccination

** Les personnes vaccinées doivent être invitées à consulter immédiatement un médecin si elles développent des symptômes tels qu'un essoufflement, des douleurs thoraciques, un gonflement des jambes, des douleurs abdominales persistantes après la vaccination. Toute personne présentant des maux de têtes sévères ou persistants ou une vision trouble après la vaccination, ou qui présente des ecchymoses cutanées (pétéchies) au-delà du site de vaccination après quelques jours, doit consulter rapidement un médecin.